

Hvad skal jeg vide om Xarelto?

- ◆ Xarelto gør blodet tyndere, hvilket forhindrer dannelse af farlige blodpropper.
- ◆ Xarelto skal tages nøjagtigt, som lægen har ordineret. For at få en optimal beskyttelse mod blodpropper må du **aldrig springe en dosis over**.
- ◆ Du må ikke holde op med at give/ tage Xarelto uden først at have talt med lægen, da risikoen for blodpropper kan stige.

- ◆ Informér sundhedspersonalet om evt. anden medicin, barnet/du tager nu, har taget for nylig, eller har til hensigt at begynde at tage, inden barnet/du begynder at tage Xarelto.
- ◆ Informér sundhedspersonalet om, at barnet/du tager Xarelto, inden operation eller andre indgreb.

Hvornår skal jeg søge råd hos lægen?

Når du tager blodfortyndende medicin som Xarelto, er det vigtigt at kende mulige bivirkninger. Blødning er den mest almindelige bivirkning.

Start ikke med at give Xarelto til barnet/ tage Xarelto, hvis du ved, at barnet/du har risiko for blødninger, uden først at have talt med lægen om det. Fortæl det straks til lægen, hvis barnet/du får tegn på blødning som f.eks.:

- ◆ smerter
- ◆ hævelse eller ubehag
- ◆ hovedpine, svimmelhed eller svaghed
- ◆ usædvanligt mange blå mærker, næseblod, blødning fra tandkødet, sår, hvor blødningen er lang tid om at stoppe
- ◆ menstruation eller vaginalblødning, som er kraftigere end normalt

- ◆ blod i urinen, der kan være rosa- eller brunfarvet, rød eller sort afføring
- ◆ ophostning af blod eller opkastning af blod eller noget, der ligner kaffegrums.

Hvordan skal jeg give Xarelto til barnet?/ Hvordan skal jeg tage Xarelto?

- ◆ For at få en optimal beskyttelse skal Xarelto 1 mg/ml gives/tages i forbindelse med madning (modermælk eller modermælkserstatning) eller et måltid. Det kan administreres via en nasogastrisk sonde eller anden ernæringssonde til ventriklen.

88034481 DA

 **Patientkort**
Xarelto® 1 mg/ml
granulat til
oral suspension

Oplysninger til omsorgspersoner/ patienter:

- ◆ Hav altid dette kort på dig
- ◆ Vis altid kortet til læge eller tandlæge før behandling af patienten.

Se træningsvideoen, der viser, hvordan du forbereder og administrerer den orale suspension.



go.bayer.com/junior

Patienten som er under antikoagulationsbehandling med Xarelto (rivaroxaban)

Navn: _____	Anden medicin/andre forhold: _____
Adresse: _____	_____
_____	_____
_____	_____
Fødselsdato: _____	Vægt: _____

I akutte situationer, kontakt venligst:

Lægens navn: _____

Lægens telefonnummer: _____

Lægens stempel: _____

Kontakt venligst også:

Navn: _____

Telefonnummer: _____

Relation: _____

Information til sundhedspersonale:

♦ INR-test bør ikke anvendes, da det ikke er et pålideligt mål for Xarelto's antikoagulerende aktivitet.



Bayer