

Hvad skal jeg vide om Xarelto?

- ◆ Xarelto gør blodet tyndere, hvilket forhindrer dannelse af farlige blodpropper.
- ◆ Xarelto skal tages nøjagtigt, som lægen har ordineret. For at få en optimal beskyttelse mod blodpropper må du **aldrig springe en dosis over**.
- ◆ Du må ikke holde op med at tage Xarelto uden først at have talt med lægen, da risikoen for blodpropper kan stige.

- ◆ Informér sundhedspersonalet om evt. anden medicin, du tager lige nu, har taget for nylig, eller som du har til hensigt at begynde at tage, inden du begynder på at tage Xarelto.
- ◆ Informér sundhedspersonalet om, at du tager Xarelto, inden operation eller andre indgreb.

Hvornår skal jeg søge råd hos lægen?

Når du tager blodfortyndende medicin som Xarelto, er det vigtigt at kende bivirkningerne. Blødning er den almindeligste bivirkning. Start ikke

behandlingen med Xarelto, hvis du ved, at du har risiko for blødninger, uden først at have talt med lægen om det. Fortæl det straks til lægen, hvis du får tegn på blødning som f.eks.:

- ◆ smerter
- ◆ hævelse eller ubehag
- ◆ hovedpine, svimmelhed eller svaghed
- ◆ usædvanligt mange blå mærker, næseblod, blødning fra tandkødet, sår, hvor blødningen er lang tid om at stoppe
- ◆ menstruation eller vaginalblødning, som er kraftigere end normalt

- ◆ blod i urinen, der kan være rosa- eller brunfarvet, rød eller sort afføring
- ◆ ophostning af blod eller opkastning af blod eller noget, der ligner kaffegrums.

Hvordan skal jeg tage Xarelto?

- ◆ For at få en optimal beskyttelse:
 - kan 2,5 mg tages med eller uden et måltid
 - kan 10 mg tages med eller uden et måltid
 - skal 15 mg tages i forbindelse med et måltid
 - skal 20 mg tages i forbindelse med et måltid.

88287355 DA

Patientkort



Xarelto® 2,5 mg
Xarelto® 10 mg
Xarelto® 15 mg
Xarelto® 20 mg

- ◆ Hav altid dette kort på dig
- ◆ Vis altid kortet til læge eller tandlæge før behandlingen

Jeg får antikoagulationsbehandling med Xarelto (rivaroxaban)

_____ Navn:	_____ Anden medicin/andre forhold:
_____ Adresse:	_____
_____	_____
_____	_____
_____ Fødselsdato:	_____ Vægt:
_____	_____

I akutte situationer, kontakt venligst:

_____ Lægens navn:
_____ Lægens telefonnummer:
_____ Lægens stempel:

Kontakt venligst også:

_____ Navn:
_____ Telefonnummer:
_____ Relation:

Information til sundhedspersonale:

- ◆ INR-test bør ikke anvendes, da det ikke er et pålideligt mål for Xareltos antikoagulerende aktivitet.

